

## ***Balsamia vulgaris*** Vitt.

**Classe** : Pézizomycètes

**Ordre** : Pézizales

**Famille** : Balsamiaceae

**Leg.** : Pierre-Vincent Nivet

**Dét.** : Guy Fourré

**Biblio** : Montecchi et Sarasini, *Funghi Ipogei d'Europa* -p 97

Lieu de récolte : " Le bois du Temple ", commune de Maine-de-Boixe, au sud de Mansle (Charente) - 10/1/2005

Ce champignon hypogé est l'un des plus faciles à reconnaître, il se distingue des autres gastéromycètes souterrains par un périidium de couleur rouge orangé lumineux, luisant, orné de très petites papilles (visibles à x 40 sous la bino). La gleba est blanchâtre, à peine teintée de jaune, avec des veines labyrinthiformes dessinant des logettes allongées et étroites. Odeur très forte et déplaisante. La longueur des spores permet de le distinguer de *Balsamia platyspora*, seule autre espèce du genre connue en Europe. Je l'avais déjà reçu de Fontcouverte près de Saintes, de Bonnes (Charente), de Cognac, et de Bagnizeau (Charente-Maritime).

Plusieurs auteurs écrivent qu'il s'agirait du seul hypogé toxique, mangé en grande quantité il pourrait provoquer nausées et vomissements. Mais le trouver en abondance semble difficile, et compte tenu de son odeur, il faudrait avoir grand faim pour avaler ça!!

Voir aussi : <http://www.ascofrance.com/index.php?r=bdd&page=fiche&id=1274>

<http://www.ascofrance.com>