

Dumontinia tuberosa (Hedw. : Fr.) Kohn (Synonyme: *Sclerotinia tuberosa* (Hedw.) Fuck.)

Classe : Léotiomycètes

Ordre : Héliotales

Famille : Sclerotiniaceae

Leg: Michel Hairaud

Det: Michel Hairaud

Biblio: GRELET p. 363-364. BK: T1, p140.

Le 1 1/04/04 dans le contrebas du Bois de St Pierre à Poitiers (86) et 3 jours plus tard en forêt de l'Hermitain (79) en bordure de route près du chemin de la fontaine de Quéré. Petite pézize d'un beau brun fauve de 2 à 3 cm de diamètre en moyenne, apparaissant sur la terre mais longuement stipitée dans le sol. Le stipe naît d'un sclérote lié aux rhizomes d'*Anemone nemorosa*. Si la plante est abondante dans bien des bois de la région, le champignon qui lui est strictement inféodé, ne l'est pas partout, loin s'en faut. Malgré de nombreuses recherches, je ne l'ai jamais trouvé en forêt de Chizé, par exemple et vu une fois à l'Hermitain (79) (Bois du Fouilloux) il y a une vingtaine d'années.

Grelet signale une récolte de P. Bouchet dans les environs de Nouillers en 1940.