

## *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühn.

**Classe** : Homobasidiomycètes

**Ordre** : Tricholomatales

**Famille** : Tricholomataceae

**Leg.** : Guy Fourré

**Dét.** : Christian Lechat et Guy Fourré

**Biblio:** KR p 164, C.&D. 473 ; Icono Däncke (700 Farb.) p 188

Lieu de récolte : sur la terre nue d'un emplacement très humide (ancienne mare) et au revers de la chaussée de l'étang -Rochard, Commune de Béceleuf (Deux-Sèvres) - MEN 1527 C

L'an dernier lors de la sortie de notre société en forêt de Chizé le 25 octobre j'avais dans ma voiture, récoltée de la veille à Rochard, une grosse touffe que je déterminais provisoirement *Lyophyllum decastes* (= *L. aggregatum*) mais qui me paraissait bizarre... C'est Christian Lechat qui m'avait mis sur la voie en évoquant *loricatum*.

A mon retour j'avais épluché les bibliographies de *decastes* et taxons voisins dans ma bibliothèque, et j'avais trouvé une bonne description de *loricatum* dans le Moser (édition en anglais) p 136, dans Kühner & Romagnesi avec rang de variété, en observation dans C.& D. mais avec rang d'espèce, et une photo en tous points conforme avec mes récoltes dans l'atlas de Dähncke.

Cette espèce ou variété (le rang choisi ne peut être qu'une hypothèse) se distingue du Tricholome agrégé classique par un chapeau beaucoup plus noir, et surtout une cuticule extraordinairement épaisse, facilement et entièrement séparable, une chair très élastique, on peut replier le bord du chapeau sans le briser !

Beaucoup d'auteurs en font un synonyme de *decastes* (= *aggregatum*), mais le " message génétique " me paraît pourtant assez différent.