

## ***Ramaria subbotrytis* (Coker) Corner**

**Classe** : Homobasidiomycètes

**Ordre** : Clavariales

**Famille** : Ramariaceae

**Leg** : Guy Fourré

**Dét.** : Guy Fourré

**Rédacteur** : Guy Fourré

**Biblio** : Cetto 777 T 2 - Jülich p 112

Le 13/7/2006, en plus de l'incroyable poussée de cèpes évoquée par ailleurs, j'ai trouvé cette splendide clavaire vers 1300 m d'altitude, sous feuillus. La couleur rose vif dominante, avec des pointes un peu plus jaunes sur les plus gros exemplaires, les rameaux courts terminés par 3-5 pointes droites et courtes, le tronc très épais, court, blanc, la chair blanche, et surtout les spores elliptiques, allongées, légèrement verruqueuses avec de petites verrues disposées en ligne, mesurant (8,7) 9,3 - 9,8 x (2,2) 3,3-3,8 µm, toutes ces caractéristiques conduisent à un taxon semblant peu connu (absent dans Breitenbach), *Ramaria subbotrytis*. Des photos tout à fait identiques, avec le même nom, figurent sur le site internet de J.J. Wuilbaut, sur la couverture d'un numéro du bulletin de la Société Mycologique de Strasbourg, et sur la couverture d'une monographie des Clavaires (Raillère M. & Gannaz M., 1999, Les Ramaria européennes, étude des espèces décrites en Europe, FMDS).

