

*Ripartites odora* Rioussset & M. Bon

**Classe** : Homobasidiomycètes

**Ordre** : Tricholomatales

**Famille** : tricholomataceae

**Biblio.** : Documents Mycologiques no 60 p. 42. Flore mycologique d'Europe 4 Clitocybes, Omphales et ressemblants, M. Bon, p. 115

Forêt de Chizé, Péré, MEN 1529 B le 24 11 04.

Trouvé pour la 2e année consécutive à même époque dans les bandes boisées de conifères entre Péré et Le Grand Mauduit, cette espèce attire l'attention par sa couleur blanche, un port d'abord tricholomoïde puis de clitocybe et surtout son odeur d'*Hebeloma sacchariolens*.



**Chapeau** 1,5-5,5 (8) cm blanc teinté d'alutacé, plat puis se déprimant, souvent papillé, à marge recourbée semi-enroulée. Couvert d'un tomentum blanc, marge pubescente, puis d'aspect lisse, luisant.

**Chair** farineuse. Lames serrées, arquées décurrentes ; partant du même niveau, brunissant.

**Stipe** cylindrique, égal ou plus épais vers le bas, 1,5-3 x 2,5-6 cm crème-rosâtre sous un voile évident le recouvrant entièrement, détersile au toucher.

**Spores** à contour et ornementation jaune d'or dans l'eau, 3,5-4 x 3 µm, verruqueuses. Boucles présentes.

Fibrilles recouvrant le stipe x 3,5-5 µm à paroi jaune dans l'eau.

